



ANİFAMİN

İ-DRIVE 7-7-7 (DENGELİ)

ANİFAMİN İ-DRIVE 7-7-7 (DENGELİ)

- Bitkinin azot, fosfor, potasyum ve iz element ihtiyacını karşılar.
- Beslenme eksikliklerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak uygulanır.
- Zengin formülü ile özel bir ürün olup bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementlerine cevap verir.



FAYDALARI:

ANİFAMİN ile tarım uygulamalarınızda verimliliği ve kaliteyi önemli ölçüde artırarak, sürdürülebilir bir üretim sağlayabilirsiniz.

- Bitki büyümesini dengeler ve ürün kalitesini artırır.
- Verimi artırır.
- Kullanılan ilaçların, makro ve mikro besin elementlerinin etkinliğini artırır.



GARANTİ EDİLEN İÇERİK		(w/w)%
Organik Madde		%15
Suda Çözünür	N	%7
Suda Çözünür	P2O5	%7
Suda Çözünür	K2O	%7
Suda Çözünür	SO3	%2
Suda Çözünür	Mo	%0,01
Suda Çözünür	Cu	%0,2
Suda Çözünür	B	%0,2
Suda Çözünür	Zn	%0,2
Suda Çözünür	Mn	%0,2
Suda Çözünür	MgO	%1
Deniz Yosunu		%1
Amino Asit		%1



UYGULAMA ÖNERİLERİ

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar	Fide dikiminden itibaren yetiştirme dönemi boyunca.
Karpuz-Kavun-Kabak	
Çilek	Meyve tutumundan sonra
Bağ-Kivi	
Narenciye	
Elma-Armut-Ayva	
Kiraz-Şeftali-Kayısı-Erik	
Zeytin	
Muz	
Mısır-Ayçiçeği	1.uygulama: Bitkiler 15-20 cm olunca 2.uygulama:Bitkiler 40-50 cm olunca
Patates-Şeker Pancarı-Havuç	1.uygulama: Bitkiler 5-6 yaprak olduğu dönemden itibaren
Buğday-Arpa-Çeltik	Kardeşlenme döneminden itibaren
Pamuk	Çapadan sonra
Fasulye-Nohut-Mercimek	1.uygulama: Çiçeklenme dönemi başlangıcında 2.uygulama: Bakla oluşum döneminde
Fındık-Ceviz Antep Fıstığı	Yapraklanmadan hasat dönemine kadar
Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık,Lahana)	Yetiştirme dönemi boyunca
Soğan-Sarımsak	
Yeşil alanlar- Süs bitkileri	

Yapraktan ve topraktan uygulama
100 lt/250-350 cc
Dekar/1.5-2.5 lt

